




Sri Anumula Revanth Reddy
Hon'ble Chief Minister, Govt. of Telangana



Shri Jishnu Dev Varma
Hon'ble Governor of Telangana & Chancellor, SKLTGHU



Sri Tummala Nageswara Rao
Hon'ble Minister for Agriculture, Marketing,
Co-operation and Handlooms & Textiles,
Govt. of Telangana



Cultivating Ideas for Sustainable Future...

**SRI KONDA LAXMAN
TELANGANA HORTICULTURAL UNIVERSITY**

2026 CALENDAR



Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Popular very sweet sapota variety (Chikoo) - Kalipatti



Sri A. Revanth Reddy, Hon'ble Chief Minister of Telangana releasing document on Perspective Plan for Horticulture in Telangana -2035

జనవరి 2026 JANUARY

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
✿	✿	✿	✿	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUARY 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

HOLIDAYS

General Holidays

14 Bhogi
15 Sankranti / Pongal
26 Republic Day

Optional Holidays

01 New Year Day
03 Birthday of Hazrath Ali (R.A)
16 Kanuma
17 Shab-E-Meraj
23 Sri Panchami

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- సపోటాలో కాయ అభివృద్ధి చెందే దశలో పొటాషియం నైట్రేట్ను లీటరు నీటికి 10 గ్రా. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. అదే విధంగా కాయ తొలుచు పురుగు నివారణకు స్పైనోసాడ్ @ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి లో పచ్చిపూత దశ / పూత వికసించే దశలో ఆశించే రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు వేప నూనె @ 5 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ @ 0.3 మి.లీ. లేదా ల్యాంబ్డ సైహ్యోలోత్రిన్ 1 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి తోటలలో ఫలధీకరణ పెంచేందుకు ఎకరాకు 4-5 తేనెటీగల పెట్టెలను అమర్చుకోవాలి.
- మామిడి లో బూడిద తెగులు నివారణకు నీటిలో కరిగే గంధకం @ 3 గ్రా. లేదా హెక్సాకోనజోల్ @ 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- ద్రాగన్ ఫ్రూట్ తోటలలో ప్రతి మొక్కకు 200 గ్రా. నత్రజని, 250 గ్రా. భాస్వరం మరియు 150 గ్రా. పొటాష్ ఇచ్చే ఎరువులు వేయాలి.
- బత్తాయి అంటు కట్టిన మొక్కలపై కనిపించే పువ్వులను తొలగించాలి. బూజు తెగులు, దోమల నివారణకు నీటిలో కరిగే గంధకం (80% WP) @ 3 గ్రాములు + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ @ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయల పంటలలో కనిపించే ఆకు మచ్చ తెగులు నివారణకు కార్బెండజిమ్ 12% + మ్యాంకోజెబ్ 63% WP మిశ్రమాన్ని లీటరు నీటికి 2 గ్రాముల చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మునగ పంటలో ఆకు తొలుచు పురుగు నివారణకు స్పైనోసాడ్ 45 SC @ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయల పంటలను ఆశించే రసం పీల్చు పురుగుల పై నిఘా కోసం పసుపు రంగు, నీలి రంగు జిగురు అట్టలు అమర్చాలి. ఫిప్రోనిల్ 5% SC మందును లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- చామంతి, బంతి పూల నాణ్యతకు మరియు గులాబిలో సూక్ష్మధాతు పోషక లోపాల నివారణకు 5 గ్రా. సూక్ష్మపోషక మిశ్రమం మరియు పొటాషియం నైట్రేట్ (13-0-45) @ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Mango at flowering stage



Presentation of award to best scientist on 11th SKLTGHU Foundation Day

ఫిబ్రవరి 2026 FEBRUARY

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿

MARCH 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

HOLIDAYS

General Holidays

15 Maha Shivarathri

Optional Holidays

04 Shab-E-Barat

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- మామిడిలో పూత మరియు పిందె రాలడాన్ని నియంత్రించడానికి ప్లానోఫిక్స్ @ 4.5 మి.లీ. 25 లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి లో 10 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన తోటలలో పైపాటుగా ఎరువులు వేయాలి. ప్రతి చెట్టుకు 500 గ్రా. యూరియాతో పాటు 2000 గ్రా. సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, 500 గ్రా. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ కలిపి వేయాలి.
- మామిడి చెట్లకు ప్రతి రోజు 3 గంటల పాటు బిందు సేద్యం ద్వారా నీటిని అందించాలి.
- మామిడిలో తేనెమంచు పురుగులు, తామర పురుగులు మరియు లద్దె పురుగుల నివారణకు థయోమిథాక్సమ్ 5% SG 0.5 గ్రాములు లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- ఆకు కూరలు, కాయగూర పంటలలో అధిక దిగుబడుల కోసం ఒక లీటరు నీటిలో 20 గ్రాముల యూరియా కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- తీగజాతి కూరగాయలలో అధిక దిగుబడుల కోసం విత్తిన 25-30 రోజుల సమయంలో డైసోడియం ఆక్టాబోరేట్ (బోరాక్స్) @ 1.5 - 2.0 గ్రాములను లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- బహు వార్షిక మునగ పంటలో ప్రతిచెట్టుకు 100 గ్రాముల యూరియా, 150 గ్రాముల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేసుకోవాలి.
- ఉల్లి నారు నాటిన 48-72 గంటల లోపు పెండిమిథాలిన్ 38.7% CS మందును ఎకరానికి 700 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.
- వంకాయ పంటను అశించే కొమ్మ మరియు కాయ తొలుచు పురుగు నివారణకు ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% SC 4 గ్రా. లేదా స్పైనోసాడ్ 45% SC 3 గ్రా. 10 లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- తీగ జాతి కూరగాయలలో కనిపించే పెంకు పురుగుల నివారణకు లీటరు నీటిలో 5 మి.లీ.వేపనూనె లేదా 3 గ్రా. థయోడికార్బ్ 75% WP కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- చామంతిలో వారం రోజుల వ్యవధిలో పొటాషియం నైట్రేట్ 4 గ్రా. మరియు సూక్ష్మపోషక మిశ్రమం 2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మల్లె పూల మొగ్గలను తొలిచే పురుగు నివారణకు 3 మి.లీ. వేపనూనె (10000 ppm) లేదా 2 మి.లీ. మలాథియాన్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Popular high yielding Tomato variety - Arka Vikas



25th Annual Group Meeting of AICRP on Tuber crops at COH, Rajendranagar

మార్చి 2026 MARCH

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

HOLIDAYS

General Holidays

- 03 Holi
- 19 Ugadi
- 21 Eid-ul-Fitar (Ramzan)
- 22 Following Day of Ramzan
- 27 Sri Rama Navami

Optional Holidays

- 10 Shahadat Hzt Ali (R.A.)
- 13 Juma-Atul-Wada
- 17 Shab-E-Qader
- 31 Mahaveer Jayanthi

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- టమాట పంటలో పూత రాలిపోకుండా ఉండేందుకు నాప్తలీన్ అసిటిక్ ఆమ్లం (NAA) 1 మి.లీ. 4.5 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. అదేవిధంగా, కాయ పగుళ్ళు రాకుండా ఉండేందుకు డై సోడియం ఆక్టా బోరేట్ 1.5 - 2.0 గ్రాములు లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయల పంటల్లో కనిపించే రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు అసిటామిప్రిడ్ 20% SP 0.3 గ్రా. లేదా ఫిప్రోనిల్ 5% SC 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి పిచికారి చేయాలి.
- బెండ పంటలో మొజాయిక్ తెగులు వ్యాప్తిజేసే తెల్ల దోమ నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 SL 3 మి.లీ. 10 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి పంటను ఆశించే పక్షికన్ను తెగులు నివారణకు కార్బెండజిమ్ 50% WP 1 గ్రా. లేదా మ్యాంకొజెబ్ 75% WP 2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- జామ తోటల్లో నీరు పెట్టడం ఆపాలి. అకాల వర్షాల వలన పూత వచ్చినట్లయితే పూత తీసి వేయాలి.
- బత్తాయి పంటలో పైపాటుగా ప్రతి మొక్కకు యూరియా 50 గ్రాములు, సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ 125 గ్రాములు మరియు మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ 40 గ్రాములు 3 వ ధాగా వేయాలి.
- నిమ్మ పంటలో ప్రతి మొక్కకు 100 గ్రా. సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, 150 గ్రా. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ 3వ ధాగా అందించాలి. అదే విధంగా సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమాన్ని 5 గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- గైలార్డియా పూలతోటలో నాణ్యమైన పువ్వుల కోసం వారానికి 13-0-45 @ 4 గ్రా. లీటరు నీటికి మరియు సూక్ష్మపోషక మిశ్రమాన్ని @ 5 గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- నేలసంపంగిలో సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమం లీటరు నీటికి 5 గ్రా. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- ఆశ్వగంధ విత్తనాలు విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. మ్యాంకొజెబ్ తో విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Inter cropping of turmeric with coconut



Hon'ble Minister for Agriculture, Sri T. Nageswara Rao Inaugurating Akshaya dining hall at SKLTGHU, Mulugu

ఏప్రిల్ 2026 APRIL

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
✿	✿	✿	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	✿	✿

MAY 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

HOLIDAYS

General Holidays

- 03 Good Friday
- 05 Babu Jagjivan Ram's Birthday
- 14 Dr.B.R.Ambedkar's Birthday

Optional Holidays

- 14 Tamil New year's day
- 20 Basava Jayanthi

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- పసుపు మరియు అల్లం పంటలలో దుంప కుళ్ళు మరియు పొలుసు పురుగు రాకుండా మెటలాక్సిల్ + మాంకోజెబ్ మిశ్రమం 2.0 గ్రాములు మరియు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి 45 నిమిషాలు ఉంచి విత్తన శుద్ధి చేయాలి.
- మామిడి లో తేనెమంచు పురుగు నివారణకు 0.3 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 SL లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి కోతకు 30 రోజుల ముందు డైఫెనకోనజోల్ 25% EC లీటరు నీటికి 0.5 మి.లీ. చొప్పున పిచికారి చేసినట్లైతే, కోత అనంతరం ఆశించే తెగుళ్ళను అరికట్టవచ్చు.
- మామిడిలో పండ్ల సంచులు తొడగని సందర్భంలో పండు ఈగ నియంత్రణ కోసం ఎకరాకు 10-12 ఫెరమోస్ ట్రాప్లు (లింగాకర్షక బుట్టలు) ఏర్పాటు చేయాలి.
- డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లో అకాల వర్షాల వల్ల వచ్చిన పూతను తీసివేయాలి. అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుండి ఉపశమనం కోసం ఎకరానికి 25 కిలోల కెయోలిన్ 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- టమాట, వంకాయ పంటల్లో పూత, కాత రాలి పోకుండా ఉండేందుకు నాఫ్థలీన్ ఆసిటిక్ ఆమ్లం 1 మి.లీ. 4.5 లీటర్లలో కలిపి పూత మరియు పిందె దశలలో పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయల పంటల్లో రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు 0.3 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 SL లేదా 2 మి.లీ. ఫిప్రోనిల్ లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటల్లో అధిక వేడి నుండి ఉపశమనం కోసం 2 శాతం (లీటరు నీటికి 20 గ్రా.) యురియా లేదా 0.5 శాతం పొటాషియం నైట్రేట్ (లీటరు నీటికి 5 గ్రా.) పిచికారి చేయాలి.
- బంతి పూత దశలో లీటరు నీటికి 4 గ్రా. పొటాషియం నైట్రేట్ మరియు 2 గ్రా. సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమం కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మల్లె తోటల్లో నేల స్వభావాన్ని బట్టి వారానికి రెండు, మూడు సార్లు నీటి తడులు ఇవ్వాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Fruit bagging technique in Mango for protection against Fruit fly, Black spot & Sun burn



Hon'ble Vice Chancellor, SKLTGHU presenting document on Perspective Plan for Horticulture in Telangana - 2035 to Hon'ble Governor of Telangana and Chancellor of SKLTGHU

మే 2026 MAY

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JUNE 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

HOLIDAYS

General Holidays


27 Eid-UI-Azha (Bakrid)

Optional Holidays

01 Buddha Purnima

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- మామిడి కోత అనంతరం ఎగుమతి కొరకు తెగుళ్ళ నివారణకు 52 డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడి నీటిలో 10 నిమిషాలు ఉంచి, తీసి ఆరబెట్టాలి.
- మామిడి కాయలను 500 ppm ఇథలిన లేదా 100 - 150 ppm ఇథెఫాన్ గ్యాస్ ఉపయోగించి మాగ పెట్టాలి.
- డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పంటలో ప్రతి మొక్కకు 15-20 కిలోల పశువుల ఎరువు, 300-400 గ్రాముల చొప్పున నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ నిచ్చే ఎరువులను వేసుకోవాలి.
- కాయగూర పంటలలో 2% (లీటరు నీటికి 20 గ్రా.) యురియా ద్రావణం పిచికారి చేయాలి. సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమం 5 గ్రాములు లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- షేడ్ నెట్ కింద ఖరీఫ్ లో సాగు చేసే కాయగూర పంట విత్తనాలను నారుమడులలో లేదా ప్రాట్రేలలో విత్తుకోవాలి.
- చామంతిలో రసంపీల్చే పురుగుల నుండి సంరక్షణ కోసం వేపనూనె 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- గులాబి మరియు మల్లె తోటల్లో నీటి తడులు ఇవ్వాలి.
- పసుపు మరియు అల్లం పంటల సాగుకు ఆఖరి దుక్కిలో 10 టన్నుల నల్లమట్టి, 8-10 టన్నుల బాగా చివికిన పశువుల ఎరువు 200 కిలోల వేప పిండి, 150 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ మరియు 25 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేసుకోవాలి.
- అల్లంలో అట్రజిన్ అనే కలుపు మందును ఎకరానికి 500 గ్రాములు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తక ముందు గాని లేదా విత్తిన వెంటనే గాని భూమిపై పిచికారి చేసినట్లైతే కలుపు నివారించవచ్చు.
- ముదురు పామాయిల్ తోటలకు అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుండి ఉపశమనం కోసం ఒక్కో చెట్టుకు 300-350 లీటర్ల నీటిని డ్రిప్ ద్వారా అందించాలి.
- పామాయిల్ లో మొక్కలు నాటిన మూడు సంవత్సరాలలోపు వచ్చే మగ, ఆడ పూల గుత్తులను తీసివేయాలి.
- తులసి పంటను ఆకు కోసం సాగు చేస్తున్నప్పుడు ఎకరానికి 105 కిలోల యూరియా, 150 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ మరియు 50 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ఎరువులు వేసుకోవాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Carissa carandas (Karonda) - Hardy and drought tolerant live fence fruit crop



KVK mandal level Rythu Sadassu at Kunaram, Peddapalli Dist.

జూన్ 2026 JUNE

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
✿	1	2	3	4	5	6
○ 7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	✿	✿	✿	✿

JULY 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

HOLIDAYS

General Holidays


26 Shahadat Imam Hussain (R.A)
10th Muharram

Optional Holidays

04 Eid-E-Ghadeer
25 9th Muharram (1446H)

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- కరోండాను ఏక పంటగా లేదా కంచె పంటగా సాగు చేస్తున్నప్పుడు, కాపుకు వచ్చిన మొక్కలకు 15 - 20 కిలోల పశువుల ఎరువును వేసుకోవాలి.
- జీలుగ (10 కి./ ఎకరానికి) లేదా జనుమును (25 కి. / ఎకరానికి) పచ్చిరొట్ట పైరుగా పండ్ల తోటలైన మామిడి, సపోట, జామ, బత్తాయి మధ్య వేసి 45-50 రోజులలో భూమిలో కలియ దున్నాలి.
- 10 సంవత్సరాలపై బడిన ప్రతి మామిడి చెట్టు కు 40 కిలోల పశువుల ఎరువు, 1.5 కిలోల యూరియా, 40 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, ఒక కిలో మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ఎరువులను వేయాలి.
- వెలుతురు బాగా సోకేందుకు మామిడి చెట్లలో కొమ్మలను కొంత మేర కత్తిరించాలి.
- తెగులు సోకిన మరియు ఎండిన మామిడి కొమ్మలను కత్తిరించి, క్లోరిఫైరిఫాస్ 5% EC 2 మి.లీ. మరియు కార్బెండజిమ్ 1 గ్రా. లీటరు నీటితో కలిపి చెట్టంతా తడిచేల పిచికారి చేయాలి.
- 5 సం. పై బడిన ప్రతి జామ చెట్టుకు ట్రైకోడెర్మ తో అభివృద్ధి చేసిన 30-40 కిలోల పశువుల ఎరువు, 500 గ్రా. యూరియా, 625 గ్రా. సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, 425 గ్రా. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేయాలి.
- జామ తోటలో మెగ్నీషియం లోపం నివారణకు లీటరు నీటికి 2 గ్రా. మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.
- 8 సం. పై బడిన సపోట తోటల్లో ప్రతి చెట్టుకు 880 గ్రా. యూరియా, 1000 గ్రా. సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, 750 గ్రా. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ మరియు 50 కిలోల పశువుల ఎరువు వేసుకోవాలి.
- ద్రాగన్ ఫ్రూట్ పంటలో పూతకు ముందు ప్రతి మొక్కకు 150 గ్రా. నత్రజని, 50 - 200 గ్రా. భాస్వరం, 100 గ్రా. పొటాష్ ఇచ్చే ఎరువులు వేసుకోవాలి.
- నెలరోజుల వయసు గల చామంతి కాండపు కత్తిరింపులను ప్రధాన పొలంలో నాటుకోవాలి.
- అల్లం పంటలో పైపాటుగా ఎకరానికి 26 కిలోల యూరియా, 20 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ జూన్ రెండవ పక్షం లో వేసుకోవాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Popular juicy vitamin C rich Sweet Orange variety Sathgudi



Shri Jishnu Dev Varma, Hon'ble Governor of Telangana and Chancellor of SKLTGHU at IV Convocation of SKLTGHU

జూలై 2026 JULY

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
✿	✿	✿	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	✿

AUGUST 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

HOLIDAYS

General Holidays


Optional Holidays

16 Ratha Yathra

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- నిమ్మ తోటలో ఆకు ముడత నివారణకు ప్రొఫెనోఫాస్ EC 50% 1.5 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- ద్రాక్ష పంటలో వేసవి కత్తిరింపుల తరువాత సైకోసిల్ (సిసిసి) అనే హార్మోనును 5 ఆకుల దశలో 5000 పిపియమ్, 12 ఆకుల దశలో 500 - 700 పిపియమ్ మరియు 15 ఆకుల దశలో 500-100 పిపియమ్ పిచికారి చేయాలి.
- జామ తోటల్లో పక్షికన్ను తెగులు నివారణకు కార్బెండజిమ్ @ 1 గ్రా. లేదా మాంకోజెబ్ @ 2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి మరియు సపోట తోటలను ఆశించే ఆకు గూడు కట్టు పురుగు గూళ్లను వెదురు కట్టెల సహాయంతో తీసివేయాలి.
- మామిడిని ఆశించే బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ నివారణకు 10 లీటర్ల నీటికి 6 గ్రా. స్ట్రెప్టోస్టెక్స్ మరియు 30 గ్రా. కాపర్ ఆక్సైడ్ 50% WP చొప్పున కలిపి 10 రోజుల వ్యవధి లో 2-3 సార్లు పిచికారి చేయాలి.
- జామలో తెల్లదోమ ఉధృతి నివారణకు పసుపు రంగు జిగురు అట్టలను ఎకరానికి 10-12 చొప్పున అమర్చుకోవాలి. అదేవిధంగా, పిండి పురుగు

- నివారణకు లీటరు నీటికి 1.5 గ్రా. అసిఫేట్ 75% SP కలిపి పిచికారి చేయాలి. కాయ తొలుచు పురుగు నివారణకు లీటరు నీటికి 0.5 మి.లీ. స్పైనోసాడ్ 45% SC కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- ద్రాగన్ ఫ్రూట్ తోటల్లో పూత కనిపించిన 30-35 రోజులకు మొక్కకు 100 గ్రా. నత్రజని, 100 గ్రా. భాస్వరం మరియు 75 గ్రా. పొటాష్ నిచ్చే ఎరువులు వేసుకోవాలి.
- చామంతి మొక్కలు నాటిన నెల తర్వాత తలలు తుంచాలి. ఫెర్టిగేషన్ ద్వారా సిఫార్సు చేసిన మోతాదు ప్రకారం ఎరువులను అందించాలి. తెగుళ్లు రాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా వేపనూనె @ 4 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- బంతిలో తెగుళ్లు రాకుండా నివారించడానికి వేపనూనె 5 మి.లీ. @ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పసుపు పంటలో ఎకరానికి 200 కిలోల వేపపిండి మరియు 50 కిలోల యూరియాను జూలై నెల రెండవ పక్షంలో వేసుకోవాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Attractive purple colour Brinjal variety - Shyamala



Workshop on NIRF ranking for Vice Chancellors of Telangana State Universities at SKLTGHU, Mulugu

ఆగష్టు 2026 AUGUST

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
30	31	*	*	*	*	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

SEPTEMBER 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

HOLIDAYS

General Holidays

10 Bonalu
15 Independence Day
26 Eid-Milad-Un-Nabi

Optional Holidays

04 Arhabeen
15 Parsi New Year's Day
21 Varalakshmi Vratam
28 Sravana Purnima / Rakhi Purnima

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- వంకాయ, టమాట పంటల్లో పూతదశలో 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు సూక్ష్మపోషక మిశ్రమం 5 గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. పూత రాలటం వారించేందుకు NAA 1 మి.లీ. ను 4.5 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- 21-25 రోజుల వయసు గల క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్ నారు, అదే విధంగా 40-45 రోజుల వయసు గల ఉల్లి నారు నాటుటకు అనువైన సమయం.
- కూరగాయ పంటలను ఆశించే ఆకుమచ్చ తెగులు నివారణకు కార్బెండజిమ్ 12% + మ్యాంకోజెబ్ 63% WP మిశ్రమాన్ని లీటరు నీటికి 2 గ్రా. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- క్యారెట్, బీట్ రూట్ విత్తనాలు విత్తుటకు అనువైన కాలం.
- మామిడి బెరడు లోపల ఉన్న తేనెమంచు పురుగుల నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.4 మి. లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- జామ తోటల్లో పిండి నల్లి నివారణకు లీటరు నీటికి 1.5 గ్రాముల అసిఫేట్ 75% SP కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి, సపోట చెట్లలో ఉన్న ఆకు గూళ్లను తీసివేయాలి.
- డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పంటలో రసం పీల్చే పిండి నల్లి నివారణకు లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. ప్రొథెనోఫాస్ పిచికారి చేయాలి.
- సీతాఫలం తోటల్లో ఒక్కొక్క చెట్టుకు 5 గ్రా. కార్బోప్యూరాన్ 3% గుళికలు వేసుకోవాలి. పిండి నల్లి నివారణకు మొక్క కాండానికి ఏదైనా చమురు పూసిన పాలిథీన్ షీట్ చుట్టాలి.
- చామంతి పంటలో పక్షం రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమాన్ని 5 గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పసుపు పంటలో ఎకరానికి 50 కిలోల యురియా, 25 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ పై పాటుగా వేయాలి. ఈ నెల రెండవ పక్షంలో సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమం లీటరు నీటికి 5 గ్రాములు కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పసుపు పంటలో దుంపకుళ్ళు / వేరుకుళ్ళు నివారణకు మెటలాక్సిల్ 4% + మ్యాంకోజెబ్ 64% WP మిశ్రమాన్ని లీటరు నీటికి 2.5 గ్రా. కలిపి నేలను తడపాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



China aster cultivar - Local Pink suitable for loose flower cultivation



Release of souvenir on CLIMAHort - 2025

సెప్టెంబర్ 2026 SEPTEMBER

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
✿	✿	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	✿	✿	✿

OCTOBER 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

HOLIDAYS

General Holidays

04 Sri Krishna Astami
14 Vinayaka Chavithi

Optional Holidays


23 Yaz Dahum Shareef

Special days of University

21 Sri Konda Laxman Bapuji Vardanthi
27 Sri Konda Laxman Bapuji Jayanthi

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- 30-35 రోజుల వయస్సు ఉన్న చైనా ఆస్టర్ను ప్రధానపొలంలో 30 X 30 సెం.మీ. దూరంలో నాటుకోవాలి.
- పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన, విచ్చుకోని నేలసంపంగి మొగ్గలను తెల్లవారు జామున లేదా సాయంత్రం వేళల్లో కోయాలి.
- మామిడి, జామ తోటల్లో సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమం లేదా ఫార్ములా - 4 ను లీటరు నీటికి 5 గ్రా. చొప్పున కలిపి చెట్లంతా తడిచేలా పిచికారి చేయాలి.
- ఉత్పాదకత లేని మామిడి తోటల్లో ఒక చదరపు మీటరుకు 3 మి. లీ. ఫ్యాక్టోబ్యూట్రాజోల్ (కల్తార్) చొప్పున నేలలో కలపాలి. అదే విధంగా, కల్తార్ వాడినప్పుడు రెండు రెట్లు అధికంగా సేంద్రియ ఎరువులు వేయాలి.
- జామ తోటల్లో పిండి పురుగు వంటి రసం పీల్చే పురుగులను నియంత్రించడానికి ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- సీతాఫలం తోటల్లో పండు ఈగ నివారణకు ఎకరానికి 10 చొప్పున లింగాకర్షక బుట్టలు అమర్చాలి.
- ద్రాగన్ ఫ్రూట్ పంటలో పక్షి కన్ను తెగులు నివారణకు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బెండజిమ్ లేదా 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్సైడ్ కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పసుపు పంటకు ఎకరానికి 50 కిలోల యురియా, 25 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ పైపాటుగా వేయాలి. సూక్ష్మ పోషక మిశ్రమం లీటరు నీటికి 5 గ్రా. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పసుపు లో దుంప ఈగ ఆశించినట్లైతే కార్బోఫ్యూరాన్ 3G గుళికలు ఎకరానికి 5 కిలోలు లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 50% EC 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పసుపు మరియు అల్లం లో దుంప ఈగ నివారణకు ప్రొఫెనోఫాస్ లేదా డైమిథోయేట్ 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొదళ్ళలో పోయాలి లేదా డ్రిప్ ద్వారా అందించాలి. అదే విధంగా, కార్బోఫ్యూరాన్ గుళికలు 5-10 కేజీలు ఒక ఎకరాకు చల్లుకోవాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Leaf Curl Virus tolerant high yielding F₁ hybrid - Arka Tejasvi



Receiving best University Award from IIT, Bombay for FOSSEE-GIS awareness

అక్టోబర్ 2026 OCTOBER

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

HOLIDAYS

General Holidays

- 02 Mahatma Gandhi Jayanthi
- 18 Saddula Bathukamma
- 20 Vijaya Dasami/ Dushera
- 21 Following Day of Vijaya Dasami/ Dushera

Optional Holidays

- 19 Mahanavami
- 26 Birthday of Hzt. Syed Mohammed Juvanpuri Mahdi Ma'ud (A.S.)

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- మిరప పంటలో నల్ల తామర పురుగు ఉధృతి నవంబర్ నుండి జనవరి వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముందస్తు చర్యగా అంతర పంటలుగా మిరప(10) : మొక్కజొన్న(3) : బొబ్బెర(1) నిష్పత్తిలో నాటుకుంటే తామర పురుగుల ఉధృతి తగ్గుతుంది. పొలంలో కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూసుకోవాలి. వేప నునెను వారానికి ఒకసారి 3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.
- మిరప పంటలో రసంపీల్చే పురుగుల ఉధృతి తెలుసుకోవడానికి ఎకరానికి 35-40 నీలి రంగు జిగురు అట్టలను అమర్చుకోవాలి. అదే విధంగా, 10 రోజులకొకసారి మార్చుకోవాలి.
- మిరపలో నల్ల తామర పురుగు నివారణకు ఫ్లక్సమెటమైడ్ 10% w/w EC @ 160 మి.లీ., ఐసోసైక్లోసెరమ్ 18.1% w/w SC @ 120 మి.లీ. చొప్పున ఎకరానికి పిచికారి చేసుకోవాలి.
- రబీ కాయకూర పంటలో అధిక దిగుబడులు పొందేందుకు ఎకరానికి 6-8 టన్నుల పశువుల ఎరువు, సిఫారసు చేసిన రసాయన ఎరువులలో 50% నత్రజని, పోటాషియం మరియు మొత్తం భాస్వరం ఎరువులను ఆఖరిదుక్కిలో వేసుకోవాలి.
- సపోట తోటలకు నీటిని అందించాలి. పొటాషియం ఎరువులను వేసుకోవాలి. అదే విధంగా, ఆకు మచ్చ తెగులు నివారణకు కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి తోటకు నీరు ఇవ్వడం ఆపాలి.
- జామ తోటల్లో పండు ఈగ నివారణ చర్యలలో భాగంగా ఎకరానికి 10 లింగాకర్షక బుట్టలు అమర్చాలి. రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు అసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పంటలో పక్షికన్ను మరియు గజ్జి తెగులు నివారణకు కార్బెండజిమ్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- చైనా ఆస్టర్ పంటలో రెమ్మలను గిల్లి వేయాలి. తరవాత నత్రజని ఎరువులను పైపాటుగా అందించాలి.
- గులాబి తోటలలో ఎండు పుల్లలను, రోగం సోకిన కొమ్మలను కత్తిరించాలి. 4-5 కొమ్మలు ఉండే విధంగా కత్తిరింపులు చేపట్టాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Orange fleshed sweet potato - Kiran



IV Intercollegiate sports, games, cultural & literary meet -2024-25

నవంబర్ 2026 NOVEMBER

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DECEMBER 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

HOLIDAYS

General Holidays


08 Deepavali
24 Karthika Purnima/
Guru Nanak's Birthday

Optional Holidays

08 Naraka Chathurdhi

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- చిలగడ దుంపలో ముక్కు పురుగు నివారణకు నాటేముందు తీగలను లీటరు నీటికి 2.5 మి.లీ. క్లోరోపైరిఫాస్ 20% EC + 2 గ్రా. కార్బెండజిమ్ 50% డబ్బ్లా.పి. ద్రావణంలో ముంచి నాటాలి.
- ఫ్రెంచ్ చిక్కుడులో తుప్పు తెగులు నివారణకు మ్యాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- ఉల్లిపంటలో కనిపించే ఎండు తెగులు నివారణకు కార్బెండజిమ్ + మ్యాంకోజెబ్ 2 గ్రా. లేదా క్లోరోథాలోనిల్ 2.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పంగలో మొవ్వు మరియు కాయ తొలుచు పురుగు నివారణకు ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% SG 0.4 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. కూరగాయ నారు మడులలో రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు 2 మి.లీ. ఫిప్రోనిల్ 5% SC లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- క్యాబేజి, కాలీఫ్లవర్ పంటను ఆశించే రసం పీల్చు పురుగుల నివారణకు పసుపు రంగు జిగురు అట్టలు అమర్చాలి. ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- చామగడ్డ పంటను ఆశించే పేనుబంక నివారణకు ఫిప్రోనిల్ 5% SC 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కంద పంటలో కోతకు నెల రోజుల ముందు లీటరు నీటికి 5 గ్రాములు సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్ కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మామిడి తోటల్లో పొటాషియం నైట్రేట్ (13-0-45) @10 గ్రాములు లీటరు కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- నిమ్మ పంటలో 2 అడుగుల ఎత్తు వరకు ప్రధాన కాండంపై ఎటువంటి కొమ్మలు అభివృద్ధి చెందకుండా చూసుకోవాలి. అదే విధంగా, బూడిద తెగులు నివారణకు డైకోఫోల్ @ 3 మి.లీ. లేదా తడి గంధకం (80% WP) @ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- బత్తాయి మరియు నిమ్మ తోటల్లో పిందె రాలటం అరికట్టేందుకు 1 మి.లీ. ప్లానోఫిక్స్ 4.5 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- జామ లో పిండి పురుగు నివారణకు ఎసిఫేట్ 75% SC 1.5 గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.



Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University

Administrative office, Mulugu (V&M), Siddipet District - 502279, Telangana.



Oil Palm with fresh fruit bunches



Participation of Hon'ble Vice Chancellor of SKLTGHU in Telangana Rising Global Summit - 2025

డిసెంబర్ 2026 DECEMBER

Sun ఆది	Mon సోమ	Tue మంగళ	Wed బుధ	Thu గురు	Fri శుక్ర	Sat శని
✿	✿	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	✿	✿

JANUARY 2027

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

HOLIDAYS

General Holidays

- 25 Christmas
- 26 Following Day of Christmas (Boxing Day)

Optional Holidays

- 24 Christmas Eve
- 26 Birthday of Hazrath Ali

Special days of University

- 23 SKLTGHU Foundation Day

ఈ నెలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు

- పామాయిల్ తోటల్లో కొమ్ము పురుగు నివారణకు 20 గ్రా. నాప్తలీన్ గోలీలను రంధ్రాలు గల పాలథీన్ కవర్లలో ఉంచి మొవ్వు భాగంలో పెట్టాలి.
- పెద్ద పామాయిల్ తోటలకు ఎకరానికి 5 కిలోల యూరియా, 3 కిలోల డి ఎ పి మరియు 5 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ లను ఫర్టిగేషన్ ద్వారా అందించాలి.
- జామ తోటల్లో అమర్చిన లింగాకర్షక బుట్టలలో ల్యూర్లను మార్చాలి. అదే విధంగా, పిండిపురుగు నివారణకు 25-30 సెం.మీ. మందం ఆల్కథీన్ షీట్ కాండం చుట్టూ చుట్టాలి. దానికి కందెన పూయాలి.
- నిమ్మపంటలో సూక్ష్మ ధాతు పోషక లోపాలను గమనించినట్లయితే సూక్ష్మపోషక మిశ్రమం 5 గ్రాములు ఒక లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- బత్తాయి పంటలో బూడిద తెగులు మరియు దోమల నివారణకు నీటిలో కరిగే గంధకం (80% WP) 3 గ్రా. మరియు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ @ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- బత్తాయి పంటలో పైపాటుగా ఒక్కో మొక్కకు 50 గ్రా. యూరియా, 125 గ్రా. సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, 40 గ్రా. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేయాలి.
- మునగ తోటలను ఆశించే ఆకుతినే పురుగుల నివారణకు అంతరకృషి చర్యలు చేపట్టాలి. 10 లీటర్ల నీటికి 3 మి. లీ. చొప్పున క్లోరాన్త్రానిలిప్రోల్ 18.5 % పిచికారి చేయాలి.
- కాయగూర పంటలను ఆశించే బూడిద తెగులు నివారణకు నీటిలో కరిగే గంధకం 3 గ్రా. లేదా డైనోకాప్ 1 మి.లీ. లేదా హెక్సాకొనాజోల్ 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- గుమ్మడి పంట సాగులో విత్తనాలను డిసెంబర్ రెండవ పక్షంలో విత్తుకోవాలి.
- మల్లెలో కొమ్మ కత్తిరింపులకు వారం రోజుల ముందు మొక్కలను నీటి ఎద్దడికి గురిచేసి, కత్తిరింపులు చేపట్టాలి. ఆ తరువాత సిఫార్సు చేసిన ఎరువులను వేసి నీరందించాలి.