



శ్రీ కౌండ లక్ష్మీమణి తాలంగాణ ఉద్యోగ వీక్షణ
వీక్షణ
అడ్మిన్ ఆఫీసు , ములుగు (వీ & మం.), సీడ్ డివీజన్ జిల్లా –
502279, తాలంగాణ

రీక్షణ రీక్షణ తాలంగాణ వీక్షణ ఆధారిత ఉద్యోగ సలహాలు

22-01-2026 నుండి 28-01-2026

ఈవారంతో కూర్చున్న సీన్ జాగ్రత్తలు:

గత రోజులకు జులవారణం:

- గడిచిన రౌండు రోజులలో రాష్ట్రంలో మాతావరణం పొడగొండో. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 28 నుండి 29 సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 16 నుండి 18 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోయే ఐదురోజుల మాతావరణ పోలికలు

- హైదరాబాద్ మాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోయే ఐదు రోజులలో రాష్ట్రంలో మాతావరణం పొడగొండో. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 28 నుండి 29 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 16 నుండి 18 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదు కావచ్చు.

మాతావరణ ఆధారిత కూరగాయల సలహాలు:

- శీతాకాలంలో మార్కెట్ కు కనీసం 5 నుండి 6 గంటల ప్రత్యేక సూర్యరశ్మి అవసరం. చలి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సూర్య మధుర లోపాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సూర్య మధుర వైన ఫార్ములా - 4 (5 గ్రాములు) ఒక లీటర్ నీటిని కలిపి పోచికారి చేయాలి.
- రాబోయే వసవి కాలంలో చీడ పీడలను తట్టుకునే హైబ్రిడ్ వీతనాలు ఎంచుకోవాలి. ఎత్తైన నారు మండలు 15 సెంటీమీటర్ల ఎత్తును మరియు 8 నుంచి 10 సెంటీమీటర్ల వరుసకు వరుస దూరంలో వీతన కోవాలి. వీతన బాడీలను ఎండిన వరిగడ్డతో కప్పవాలి. ఎడల త్వరగా మౌలికీకృతమవుతుంది.
- టమాటా, వంకాయ, బొండ్, సొరకాయ, బీరకాయ, కాకరకాయ వంటి తీగజాతి కూరగాయలు మరియు ఆకుకూరలు నాటడానికి ఉత్తమ సమయం.
- టమాటా, చిక్కుడు, క్యూబ్జీ, క్యూబ్జీలవర్లలో పనుబంక మరుగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది. దీనిని నివారణకు ఫంప్ రోస్ 5 % ఎస్. సీ2 మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి లేదా ఇమిడిక్లోరోఫాస్ 0.3 మిల్లీలీటర్ పర్ లీటర్ నీటిని కలిపి పోచికారి చేయాలి.
- తొలగొండ రాష్ట్రంలో పొరుగుతున్న చలి తీవ్రత వల్ల ప్రస్తుతం సాగు చేస్తున్న టమాటా, వంగ, గోరు చిక్కుడు. తీగజాతి కూరగాయలైనటువంటి బీర, కాకర, సొర, చిక్కుడు కూరగాయలకు బాడీ తగ్గులు ఎక్కువగా ఆశిస్తూ ఉంటాయి. దీనిని నివారించడానికి అజోక్సీస్ట్రోబిన్ 1.5 గ్రామ్ ఒక లీటర్ నీటిని కలిపి పోచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో వచ్చే సర్క్యూస్ ఫోరా మరియు ఆల్టర్నెరియా ఆకు మచ్చ తగ్గుతూ నివారణకి కార్బండిజిం + మ్యాంగ్నీజిన్ @ 1g/l, హాక్సాకానజిల్ @ 1ml/lit పోచికారి చేసుకోవాలి.

- **మూమీడి** - మూత మూర్తానికి వాడవచ్చు. నల్లని మూత దళ లోదా గుండు సూది పరిమాణం వచ్చిన తరువాత నీరు అందించడం ప్రారంభించాలి, 4 లోదా 6 డిగ్రీల పరిధిని కొండొనకి 1.5 మి. దూరంలో ఉంచి రోజుకు 2 గంటల పాటు నీరు అందించాలి. రసం పోలి చీ మరుగులు రాకుండా నీవారణ చర్మంగా వేప నూనె (Neem oil) @ 5 మి.లీ/లీ నీటికి కలిపి పోచికారీ చేయాలి. రసం పోలి చీ మరుగులను నీయంతో రించడానికి ఇమీడాక్లోప్రోడీ @ 0.3 మి.లీ/లీ. లోదా ఎస్పీట్ @ 1.5 గ్రా/లీ. నీటికి కలిపి పోచికారీ చేయాలి. తొటలో సమర్థవంతమైన పరాగ సంపర్కం మరియు పొందాలు కట్టడం కోసం ఎకరాకు 2 తేనెటీగల పోట్లను ఏర్పాటుచేయాలి.
- **జామ** - టీ దోమ మరియు కాంకర్యుక్కు సంకల్పిట లక్షణాలు గమనించినట్లయితే, దొబ్బితొన పండ్లను సకరించి నాశనం చేయాలి మరియు తరువాత ల్యూమిడాస్పైహాలోథ్రిన్ @ 0.5-1.0 మి.లీ/లీ టెరు + కార్బండిజిమ్ + మాంక్రోజిబ్ @ 2 గ్రా/లీ చొప్పున పోచికారీ చేయాలి.

- **నోమోమ** - సోటర్నోక్యూంకర్ లక్ష్మణాలు కనబడితే, రోగ గ్రహస్థమైన కొమ్మలు మరియు ఆకులను తొలగించి నాశనం చేయాలి. అనంతరం కౌపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 50 WP @ 30 గ్రా + సోటర్నోక్యూంకర్ 1 గ్రా / 10 లీటర్ల నీటికి పరిచీకారీ చేయాలి.
- **సోటిటోఆరంజ్** - మంగు ముందస్థు నోవారణకు పిందా కట్టినదశలో సల్ఫర్ (3 గ్రా/లీటర్) లేదా ఓమైట్ (2 మి.లీ/లీటర్) లేదా డైక్లోఫాల్ (5 మి.లీ/లీటర్) లేదా ఫాసల్ఫ్ (3 మి.లీ/లీటర్) పరిచీకారీ చేయాలి.

దోరాక్ష్

- ఉష్ణోగ్రతలు క్షరమంగా తగ్గుతున్నందున బూడిద తొగులు కనిపించే అవకాశం ఉంది, వ్యూధి లక్ష్మణాలు కనిపిస్తే 1 మి.లీ/లీ హాక్సాక్సానాజోల్ లేదా డైఫ్లూక్సానాజోల్ కలిపి పరిచీకారీ చేయాలి.
- తొట్టలో మిల్లీబగ్ దాడి మోస్తరుగా ఉండవచ్చు. అవసరమైతే మౌక్ కలపై సోపాట్ అప్ లిక్వెస్ గా బుప్రోఫెజిన్ 25 SC @ 1.25 మి.లీ + మైటోరహిజియం అనీస్ పోలియే 3 మి.లీ/లీ నీరుతో ప్లాంట్ వాష్ చేయాలి.

జైషధ మరియు సుగంధమౌక్ కల

- **పసుమ** - పసుమ ఆకులు పసుమ రంగుకు మారడం ఒకవైపుకు హానిపోవడం, రోజు లక్ష్మణాలను గమనించి కోత మొదలు పోటటాలి. నేల పై భాగాలను పొలానికి దగ్గరగా కత్తిరించాలి. కోతకు 1 లేదా 2 రోజుల ముందు తేలికపాటి నీటిపారుదల ఇవ్వాలి. పసుమను కోసిన తర్వాత పసుమ దుంపలకు అంటి ఉన్నమట్టాని తొలగించి శుభ్రపరచాలి. పంట కోత సమయంలో కొమ్మలకు ఏవిధమైన దాబ్బతగలకుండా జాగ్రత్తపడాలి. శుభ్రపరచిన తల్లీ, పోలీల దుంపలను వేరు చేయాలి. వీటితో పాటు దుంప మచ్చ/కుళ్ళు ఆశించిన దుంపలు, కొమ్మలు కూడా వేరు చేయాలి. తవ్విన 2-3 రోజులలో పంట ఉడికించాలి. దీనివల్ల మంచి నాణ్యతతో పాటు రొకవరీ అధికంగా ఉంటుంది. ఆలస్యంగా ఉడకబాటడం వల్ల రొకవరీతో పాటు నాణ్యత తగ్గుతుంది. ఉడకబాటటపుడు దుంపలను, కొమ్మలను వేరుగా ఉడకబాటటాలి.
- **అలొవారా** - ఉన్నపంట - నేలలో తేమ తక్కువగా ఉన్నచో తేలిక పాటి నీటి పారుదల చేయాలి; కలుమ మౌక్ కలు మరియు ఎండిన ఆకులను తొలగించాలి.
- **అశ్వగంధ** - ఎండబాటిన వేర్లముక్కలను పొడి, గాలి బాగా పోరసరించే పోరదేశంలో సక్రమంగా నీలివచేయాలి; వేర్లగ్గరడింగ్ చేయవచ్చు.
- **కల్మషు (నీలవేము)** - ఉన్నపంట - తేలిక పాటి కలుమ తీయడం వంటి అంతర సాగు పనులు చేయాలి.
- **లొమన్ గ్రాఫ్** - క్షరమం తవ్వకుండా నీటిపారుదల కొనసాగించాలి; ఎండిన ఆకులను తొలగించాలి; రాబోయే కోతకు సిద్ధం చేయాలి.

- **జొరొనోయం** - ఉన్ నపంట - అర్ధనీడ (సామీషాడ్) పరోస్థితులు కల్పించాలి; తేలికపాటి నీటిపారుదలచేయాలి; కీటకాలు మరియు రోగాల పై గమనించాలి.
- **మింట** - ఉన్ నపంట - క్షరమం తవ్వకుండా నీటిపారుదల చేయాలి; కలుపు మౌక్ కలను తొలగించాలి; శాశీయవృద్ధిని పరోత్సహించాలి.
- **తులసి (బేసీల్)** - మౌలకౌత్తిన తరువాత మౌక్ కల వృద్ధిని గమనించాలి; అవసరమైతే మౌక్ కలను మౌక్ కల మధ్య అంతరం పొందడం/ మౌక్ కలను తొలగించడం (థిన్ నంగ్) సందర్భానాబట్టి; తేలిక పాటి నీటిపారుదల మరియు కలుపుని యంత్రణ చేయాలి.
- **ఆయిల్ హమ్**- ఎదగిన ఆయిల్ హమ్ తొటలో తగిన మట్టి తేమను కాపాడేందుకు ప్లరత్ రోజూ ఒక్కో మౌక్ కకు సుమారు 160 లీటర్ల నీరు అందోస్తూ క్షరమం బద్ధమైన సేద్యం నోరవహించాలి. మౌక్ క పాదుల శుభ్రత, తేలిక పాటి నీటి కలుపు మరియు కలుపు నీయంత్రణను చేతితో చేయాలి లేదా అవసరమైతే గ్లొఫోసినీట్ అమోనియా లేదా హార్వోక్ హట్ @ 2.5 మి.లీ./లీటరు నీరుతో పాదులలో మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి; ఆకు పచ్చ భాగాలకు మందు తగలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఎదగిన తొటలో ప్లరత్ నాలా ఒక ఎకరాకు 5 కేజీల యూరియా, 3 కేజీల డి.ఎ.పి., 5 కేజీల మ్యూరియాట్ ఆఫ్ పొటాష్ ను బిందు/తుంపర సేద్య ద్వారా అందోస్తూ ఫర్టిగేషన్ కొనసాగించాలి. తేమ నీలుపు దల కోసం అందుబాటులో ఉన్ ససేంద్రియ అవశోషణతో మౌక్ క పాదులలో మల్చింగ్ బలోపేతం చేయాలి. తొగుళ్లు మరియు పోషక లోపాల కోసం మౌక్ కలను క్షరమం తవ్వకుండా పరోశీలించి ముందస్థు నోవారణ చర్యలు చేపట్టాలి. పండిన గొలలను నోరణిత వ్యవధులలో కోయడం కొనసాగిస్తూ మాత్రం తొటలో శుభ్రత మరియు పరోశుభ్రత పాటించాలి.

పూలు

- **చందనో/Annual Chrysanthemum**- పూల కోతకు ఒకరోజు ముందు పలుచటి నీటి తడులు ఇవ్వడం వలన పూల నీలవకాలం పొరగడంతో పాటు పూలు ఎక్కువ బరువు తొగుతాయి. పూత దశలో సూక్ష్మమధాతుమల పిచిచికారి @4 ml/l చేయాలి.
- **గ్లోడోయోలస్**- గ్లోడోయోలస్ పూల బరువుకి మౌక్ క ఒరిగి పోకుండా మౌక్ క మౌదళలో మట్టిని ఎగదోసి మరియు కర్తతో ఊత మందించాలి. పూత దశలో సూక్ష్మమధాతుమల పిచిచికారి @4 ml/l చేయాలి.

- మల్లాలా- మల్లాలాలో కొమ్మ కత్తరింపులు తర్వాత కొత్త ఆకు చీగురించే దశలో రసం పీల్చేపరుగులు ఆశించకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా లీటర్ నీటికొగాను, 5 మల్లాలీటర్ 1% వేప నూనూను చేర్చి పోచూరి చేయాలి.